

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον εμβολιασμό σχετίζονται με αυτές της απάντησης του οργανισμού στο εμβόλιο.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται συνήθως λίγο μετά τον εμβολιασμό.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι :


- Τοπικές (π.χ. πόνος, ερυθρότητα και σκλήρυνση στο σημείο της χορήγησης)
- Συστηματικές (κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, πόνος στις αρθρώσεις, ρίγη, πυρετός).

Ο πυρετός είναι ήπιος (38,0–38,4 °C), μέτριος (38,5–38,9 °C) και σοβαρός (39,0–40 °C).

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

- Ελαφριές - είναι ενοχλητικές αλλά δεν παρεμποδίζουν σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες,
- Μέτριες - μπορεί να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες,
- Σοβαρές – παρεμποδίζουν σημαντικά τη διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων:

ο δυσκολία στην αναπνοή
ο πόνος στο στήθος
ο πρήξιμο των ποδιών
ο έντονο και επίμονο κοιλιακό άλγος
ο επίμονος πονοκέφαλος
ο θολή όραση
ο κηλίδα αίματος κάτω από το δέρμα μακριά από τη θέση του εμβολίου



Τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των παρενεργειών!