

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ COVID - 19 ΑΝ ΕΧΩ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ;

ΟΧΙ

- Η αναφυλακτική αντίδραση στο εμβόλιο ή στα συστατικά του εμβολίου αποτελεί αντένδειξη στον εμβολιασμό

ΝΑΙ

- Εάν είχατε αλλεργική αντίδραση εντός 4 ωρών ή/και αναφυλαξία που σχετίζεται με εμβόλιο ή ενέσιμο φάρμακο που δεν περιέχει συστατικό ή συστατικό διασταυρούμενης αντίδρασης των εμβολίων COVID-19, μπορεί να σας χορηγηθεί εμβόλιο COVID-19.
- Θα σας ζητηθεί να περιμένετε στην κλινική για 30 λεπτά μετά το εμβόλιο.

ΝΑΙ

- Εάν έχετε ιστορικό σημαντικών αλλεργικών αντιδράσεων ή/και αναφυλαξίας σε οποιοδήποτε τρόφιμο, φάρμακο, δηλητήριο, λάτεξ ή άλλα αλλεργιογόνα που δεν σχετίζονται με τα εμβόλια COVID-19, μπορεί να σας χορηγηθεί εμβόλιο για τον COVID-19.
- Θα σας ζητηθεί να περιμένετε στην κλινική για 30 λεπτά μετά το εμβόλιο.

ΝΑΙ

- Εάν έχετε προβλήματα με αλλεργίες, όπως καταρροή, φτέρνισμα, φαγούρα στη μύτη και τα μάτια, άσθμα και έκζεμα, μπορείτε να κάνετε το εμβόλιο.
- Θα σας ζητηθεί να περιμένετε στην κλινική για 30 λεπτά μετά το εμβόλιο.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Το προϊόν αυτό έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου IENE 11-PROVAC.
Αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτό. Παρακαλώ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.iene11.eu



Pro Vac
Promoting Vaccination
IENE II