

POT FI VACCINURILE ASOCIATE CU DEZVOLTAREA UNOR REACTII ADVERSE?

Majoritatea reacțiilor adverse la vaccinare sunt așteptate și sunt asociate cu răspunsul organismului la vaccin.


Reacțiile adverse apar în general în scurt timp de la administrarea vaccinului.

Reacțiile adverse pot fi :

- **Locale** (ex. durere, roșeață și indurație la locul administrării)
- **Sistemice** (oboseală, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare, frisoane și febră . Febra este ușoară (38.0–38.4°C), medie (38.5–38.9°C) și severă (39.0–40°C).

Reacțiile adverse sunt:

- **Ușoare** – sunt deranjante dar nu interferă semnificativ cu desfășurarea activităților zilnice,
- **Medii** – pot interfera cu desfășurarea activităților zilnice,
- **Severe** – interferă semnificativ cu sau împiedică desfășurarea activităților zilnice:
 - dificultăți de respirație
 - durere în piept
 - umflarea picioarelor
 - durere abdominală puternică și persistentă
 - dureri de cap persistente
 - vedere încețoșată
 - pete mici de sânge sub piele la distanță de locul administrării vaccinului



Beneficiile vaccinării depășesc riscurile efectelor adverse!