

POT PRIMI VACCINUL COVID - 19 DACA AM ALERGII?

NU

- Reacția anafilactică la vaccin sau ingrediente din vaccin, reprezintă contraindicație pentru vaccinare

DA

- Dacă ați avut o reacție alergică în decurs de 4 ore și/sau anafilaxie, asociată cu un vaccin sau cu un medicament injectabil care nu conține o componentă sau o componentă cu reacție încrucișată a vaccinurilor COVID-19, vi se poate administra vaccinul COVID-19.
- Vi se va cere să așteptați în clinică timp de 30 de minute după vaccin.

DA

- Dacă aveți antecedente de reacții alergice semnificative și/sau anafilaxie la orice aliment, medicament, venin, latex sau alți alergeni care nu au legătură cu vaccinurile COVID-19, vi se poate administra vaccinul împotriva COVID-19.
- Vi se va cere să așteptați în clinică cel puțin 15 minute după vaccinare.

DA

- Dacă aveți probleme legate de alergii, cum ar fi secreții nazale, strănut, mâncărimi la nas și la ochi, astm și eczeme, puteți primi vaccinul.
- Vi se va cere să așteptați la clinică cel puțin 15 minute după vaccinare.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Acest produs a fost creat în cadrul proiectului IENE 11- PROVAC.
Acesta reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă
pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta.
Vă rugăm să vizitați www.iene11.eu



Pro Vac
Promoting Vaccination
IENE 11