

EXISTĂ CONTRAINDICAȚII LA VACCINARE?



CONTRAINDICAȚII DEFINITIVE

- reacții anafilactice în antecedente la același vaccin sau la componente ale vaccinului
- antecedente de hipersensibilitate la orice vaccinuri sau la oricare dintre excipienți, inclusiv neomicină
- imunodeficiență umorală sau celulară severă (limfociteT CD4+ mai mici de 200/mm³)



CONTRAINDICAȚII TEMPORARE

- sarcina
- afecțiuni febrile (>38,5°C)
- tuberculoză activă netratată
- post transplant medular (până la 24 luni)
- post transplant de organ (până la 4 săptămâni)
- imunodeficiența tranzitorie (limfociteT CD4 mai mici de 200/mm³)
- terapie imunosupresivă curentă (inclusiv doze mari de corticosteroizi).



FALSE CONTRAINDICAȚII

- afecțiuni acute nonfebrile
- atopia (rinita, conjunctivita, astmul bronșic, dermatita atopică)
- intervenții chirurgicale sau stomatologice,
- investigații de rutină pentru alte afecțiuni
- diareea cu afebrilitate
- alergia la ou
- bolile neurologice, etc.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Acest produs a fost creat în cadrul proiectului IENE 11- PROVAC.
Acesta reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă
pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta.
Vă rugăm să vizitați www.iene11.eu



Pro Vac
Promoting Vaccination
IENE 11